

ENCUESTA NACIONAL DE FACTORES DE RIESGO

DATOS PARA LA PROVINCIA DE SALTA

Indicadores seleccionados. Años 2005 - 2009 - 2013

INDICADORES	ENFR 2005	ENFR 2009	ENFR 2013
	Total IC 95%	Total IC 95%	Total IC 95%
Cobertura de salud obras social/prepaga/plan o programa estatal	47,5% 42,9-52,1	56,0% 53,6-58,4	58,7% 49,6-68,0
Salud general regular o mala	29,2% 26,6-31,9	25,8% 23,3-28,6	26,0% 21,1-30,9
Problemas de ansiedad/depresión	-	26,5% S/D	22,5% 17,1-27,8
Actividad física baja	42,8% 37,7-48,1	35,8% 32,7-39,0	47,7% 41,8-53,5
Consumo promedio diario de frutas o verduras	-	1,0 S/D	1,88 1,61-2.15
Agrega sal al sentarse a la mesa siempre o casi siempre	17,1% 13,8-20,4	16,7% 14,3-19,9	11,0% 8,1-13,1
Sobrepeso	32,2% S/D	37.7% S/D	38,1% 36,3-39,8
Obesidad	13,8% S/D	16,3% S/D	18,5% 14,8-22,0
Consumo de tabaco (más de 100 cigarrillos)	32,1% 28,9-35,6	26,1% 23,1-29,3	21,8% 18,4-25,5
Exposición a humo de tabaco ajeno (entre no fumadores)	49,0% 44,5-53,5	46,3% 42,3-50,3	41,1% 37,0-45,0
Exposición a humo de tabaco ajeno en bares/restaurantes	-	77,4% S/D	41,3% 24,6-57,8
Control de presión arterial en los últimos dos años	72,1% 68,6-75,3	79,1% 76,3-81,7	90,7% 89,1-92,2
Prevalencia de hipertensión arterial (sobre los que se controlaron)	27,7% 25,0-30,6	31,5% 28,7-34,4	35,0% 30,6-39,4
Control de colesterol (mujeres >44 / hombres > 34)	59,1% 52,6-65,6	69,8% 65,5-74,2	73,8% 62.0-85.5
Prevalencia de hipercolesterolemia (sobre los que se controlaron)	29,0% 25,0-33,4	36,6% 32,6-40,8	35.3% 31.5-39.0
Control de glucemia alguna vez	59,7% 53,6-65,5	67,8% 64,0-71,4	66.0% 56,4-75,5
Prevalencia de diabetes (sobre los que se controlaron)	4,2% 3,3-5,5	8,5% 6,8-10,5	11,0% 8,7-13,1
Realización de papanicolau en los últimos dos años en mujeres 25-65 años ¹	44,7% 38,9-50,7	68,4% 58,6-76,0	58.5% 46,5-70,3
Realización de mamografía en mujeres de 50 - 70 años ¹	22,2% 16,5-29,2	47,2% 32,6-62,2	53,0% 38,1-67,7
Realización de tamizaje para cancer de colon (personas de 50 a 75 años) ²	-	-	21,6% 17,0-26,1
Consumo regular de alcohol de riesgo	5,6% 4,1-7,5	7,6% 5,8-9,7	8,6% 6,4-10,8
Consumo episódico excesivo de alcohol	14,2% 11,9-16,8	10,5% 8,3-13,2	12,6% 8,9-16,2
Manejó al menos una vez un auto, moto o bicicleta luego de haber tomado alguna bebida con alcohol ²	-	-	14,7% 10,2-19,1
Uso de cinturón (siempre) entre los que anduvieron en auto	19,9% 17,1-23,0	39,2% 35,4-43,1	58,3% 50,9-65,8
Uso de casco en bicicleta (siempre) entre los que anduvieron en bicicleta ³	-	-	9,5% 1,0-12,9
Uso de casco en moto (siempre) entre los que anduvieron en moto	-	-	44,7% 21,5-67,9

¹ Los datos no deben compararse dado que las muestras no son iguales (diferentes grupos de edades).

² Indicador medido por primera vez.

³ No se realiza análisis comparativo, dado que las muestras no son iguales (las ENFR de los años 2005 y 2009 toman como un solo grupo a los usuarios de motos y bicicletas, mientras que la ENFR del año 2013, los toma por separado.