

Situación.	Cuadro clínico.	Días de aislamiento	Días de testeo.	Alta de aislamiento	Reforzar medidas de prevención
Caso confirmado	Asintomáticos, sintomáticos leves o moderados de manejo ambulatorio	5 días desde FIS o diagnóstico.		Día 5. Sin test adicional	Durante 5 días Luego del alta.
	Paciente grave o inmuno-comprometido severo <sup>ii</sup>	20 días		Día 20 sin test adicional	
		10 días	día 10	Día 10 con test negativo	
	Paciente internado leve a moderado	10 días		Día 10, sin test adicional	
Contactos estrechos	Cuidados estrictos por 10 días, no requiere aislamiento.				

Actualización al 5 de diciembre de 2022.

<sup>i</sup> No concurrir a eventos masivos ni reuniones sociales, utilizar barbijo de forma adecuada, bien ajustado, tapando nariz, boca y mentón- en forma permanente en ambientes cerrados o abiertos donde haya otras personas, mantener la distancia social, ventilar los ambientes de manera continua, extremar los cuidados ante la presencia de personas con factores de riesgo. Auto-monitoreo de síntomas diariamente y comunicar cambios inmediatamente. No podrá compartir lugares de descanso ni comidas en la institución. Deberá trabajar toda la jornada laboral utilizando barbijo quirúrgico, y en caso de ser personal de salud, con atención directa de pacientes, utilizar respirador tipo N95. Deberá realizar higiene de manos con mayor frecuencia.

<sup>ii</sup> Se puede optar por acortar el aislamiento, con la realización de un test diagnóstico al día 10 de internación, con su resultado negativo.

<sup>iii</sup> Instituciones carcelarias, instituciones de salud, centros con personas institucionalizadas, personas que trabajen o presten cuidados a personas vulnerables.