

Situación.	Cuadro clínico.	Días de aislamiento	Días de testeo.	Alta de aislamiento	Reforzar medidas de prevención ⁱ
Caso confirmado	Asintomáticos, sintomáticos leves o moderados de manejo ambulatorio	5 días desde FIS o diagnóstico.		Día 5. Sin test adicional	Durante 5 días Luego del alta.
	Paciente grave o inmunocomprometido severo ⁱⁱ	20 días		Día 20 sin test adicional	
		10 días	día 10	Día 10 con test negativo	
	Paciente internado leve a moderado	10 días		Día 10, sin test adicional	
Poblaciones especiales ⁱⁱⁱ	Asintomáticos, sintomáticos leves o moderados de manejo ambulatorio	Trabajadores: 5 días desde el diagnóstico o FIS. Puede regresar a tareas con 24 hs de mejoría clínica		Día 5. Sin test adicional	Durante 5 días Luego del alta.
		Residentes: seguimiento clínico estricto y de sus contactos estrechos según protocolos vigentes			
Contactos estrechos	Cuidados estrictos por 10 días				

Actualización al 13 de junio de 2022

ⁱ No concurrir a eventos masivos ni reuniones sociales, utilizar barbijo de forma adecuada, bien ajustado, tapando nariz, boca y mentón- en forma permanente en ambientes cerrados o abiertos donde haya otras personas, mantener la distancia social, ventilar los ambientes de manera continua, extremar los cuidados ante la presencia de personas con factores de riesgo. Auto-monitoreo de síntomas diariamente y comunicar cambios inmediatamente. No podrá compartir lugares de descanso ni comidas en la institución. Deberá trabajar toda la jornada laboral utilizando barbijo quirúrgico, y en caso de ser personal de salud, con atención directa de pacientes, utilizar respirador tipo N95. Deberá realizar higiene de manos con mayor frecuencia.

ⁱⁱ Se puede optar por acortar el aislamiento, con la realización de un test diagnóstico al día 10 de internación, con su resultado negativo.

ⁱⁱⁱ Instituciones carcelarias, instituciones de salud, centros con personas institucionalizadas, personas que trabajen o presten cuidados a personas vulnerables.